

Le Score de Francis vous permet d'évaluer **le niveau de sévérité de votre SII** en renseignant ce test rapide en 7 questions.
L'APSSII vous recommande de consulter votre médecin pour un diagnostic approprié.


Comment renseigner ce test ?

- Répondez aux questions en reportant vos résultats dans la case Score
- Additionnez le total dans la dernière case

SCORE

Souffrez-vous actuellement de douleurs abdominales (= douleurs au ventre) ? oui non

Si oui, **quelle est l'intensité de ces douleurs abdominales ?**



Veillez indiquer le nombre de jours au cours desquels vous souffrez sur les 10 derniers jours


Exemple : si votre réponse est 4, cela signifie que vous souffrez 4 jours sur 10. Si vous souffrez tous les jours, inscrivez le chiffre 10

Nombre de jours au cours desquels vous souffrez x 10

Résultat de la multiplication

Souffrez-vous actuellement de problèmes de distension abdominale (= ballonnements, ventre gonflé, tendu) ? oui non
Si vous êtes une femme, ne tenez pas compte des problèmes de distension dus à vos règles

Si oui, **quelle est l'importance de ces problèmes de distension abdominale ?**



Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la fréquence à laquelle vous allez habituellement à la selle ?



Dans quelle mesure le Syndrome de l'Intestin Irritable affecte ou perturbe votre vie en général ?



Score de sévérité du Syndrome de l'Intestin Irritable

= somme des résultats précédents

Comment interpréter le résultat de ce test ?

Score < 75	Pas de SII ou SII en rémission
Score de 75 à 175	SII de forme minime
Score de 175 à 300	SII de forme modérée
Score de 300 à 500	SII de forme sévère